Continue

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Solución (ótica)Cada mL contiene: Acetónido de fluocinolona 0.250 mgSulfato de Polimixina B equivalente a 10,000.000 U de Polimixina BSulfato de neomicina, equivalente a 3.500 mg de NeomicinaClorhidrato de Iidocaína 20.000 mgExcipiente cbp 1.000 mL INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de la otitis externa y otras condiciones inflamatorias, alérgicas y pruriginosas que responden a los esteroides y en las cuales está presente una infección o se sospecha su existencia.SYNALAR®-O combina la potente actividad antiinflamatoria, antialérgica, anestésica y antipruriginosa tópica del Acetónido de fluocinolona con la actividad antibacterial del sulfato de neomicina. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Las preparaciones de SYNALAR®-O son altamente efectivas debido a las acciones antiinflamatoria, antiprurítica, antialérgica y vasoconstrictora del Acetónido de fluocinolona y a la actividad antibiótica del sulfato de neomicina. La penetración percutánea de los corticosteroides varía dependiendo del paciente y puede modificarse dependiendo del vehículo utilizado, la duración y superficie de la aplicación y las condiciones de la piel, así como la temperatura de la piel y el grado de hidratación del paciente.Después de la absorción, el 90% o más del cortisol en plasma se encuentra unido reversiblemente a las proteínas. Sólo la fracción del corticosteroide libre entra a las células donde produce sus efectos corticosteroidales.Todos los esteroides adrenocorticales y sus derivados sintéticos biológicamente activos presentan un doble enlace en las posiciones 4, 5 y un grupo cetona en C3. Como regla general, el metabolismo de los esteroides conlleva varias adiciones de átomos de oxígeno o hidrógeno, seguido por la formación de conjugados, que son compuestos más hidrosolubles. La reducción del doble enlace 4, 5 ocurre en el hígado y fuera de éste, produciendo en ambos casos compuestos inactivos.Únicamente en el hígado ocurre la reducción del sustituyente 3-cetona al derivado 3-hidroxilo formando tetra-hidrocortisol. En el hígado, la mayor parte de estos esteroides se conjugan por reacciones enzimáticas con sulfato o glucurónido con el grupo 3-hidroxilo, estas reacciones ocurren también pero en menor grado en el riñón.Los derivados hidrosolubles (ésteres de sulfato o glucurónidos) resultantes y los demás metabolitos predominantes se eliminan por vía urinaria. En el ser humano, la eliminación de corticosteroides por las vías biliar o fecal, no presenta ninguna relevancia.La acción no específica de los corticosteroides puede explicarse por la inducción de proteínas inhibidoras de fosfolipasa A2 (Iipocortinas) a nivel celular, lo que disminuye la formación, liberación y las acciones de los mediadores químicos endógenos de la inflamación, como son las cininas, histamina, enzimas Iiposomales, prostaglandinas y los sistemas del complemento. Adicionalmente, se cree que los macrófagos y leucocitos toman parte en el inicio de las respuestas inducidas por los mediadores químicos endógenos antes mencionados. La aplicación de corticosteroides inhibe la marginación (adhesión de pequeñas vesículas a las paredes) y la posterior migración de macrófagos y leucocitos al área.El efecto resultante no sólo es el antiinflamatorio, sino también una reversión de la dilatación vascular y la permeabilidad de las vesículas en el área afectada, lo que clínicamente se observa como disminución del edema, eritema y prurito. Las acciones antimitóticas de los corticosteroides, en especial de las especies fluoradas, se relacionan principalmente con las células de la epidermis humana y los fibroblastos cutáneos. CONTRAINDICACIONES: Infecciones micóticas o virales no tratadas. Herpes simple, vacunas y varicela. Hipersensibilidad a algún compuesto de la medicación. Perforación timpánica. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se recomienda el uso de SYNALAR®-O durante el primer trimestre del embarazo. Si se usa durante el segundo y tercer trimestres, deberán valorarse los beneficios esperados en relación con los riesgos potenciales en el feto.El empleo en este periodo queda bajo criterio médico, valorando riesgo-beneficio. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Se han reportado ardor, prurito, irritación, resequedad, foliculosis, hipertricosis, erupciones acneiformes, hipopigmentación, dermatitis alérgica por contacto, infección secundaria y atrofia de la piel, con el uso de corticosteroides tópicos. Se ha reportado ototoxicidad y nefrotoxicidad con el uso tópico de neomicina. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: El uso de SYNALAR®-O en humanos no se ha relacionado con efectos de carcinogénesis, mutagénesis o teratogénesis, asimismo, no se ha relacionado con alteraciones de la fertilidad. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han reportado interacciones medicamentosas con este producto. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado alteraciones de las pruebas de laboratorio con este producto. PRECAUCIONES GENERALES: El uso prolongado de los corticosteroides tópicos puede producir atrofia de la piel y tejidos subcutáneos. Los glucocorticoides pueden enmascarar algunos signos de infección y nuevas infecciones pueden aparecer durante su uso.El tratamiento prolongado puede favorecer el desarrollo de organismos no susceptibles y hongos. Debido a que no se ha observado actividad sistémica con las dosis terapéuticas de SYNALAR®-O, se deberá tener cuidado al transferir pacientes con tratamiento esteroidal sistémico al de SYNALAR®-O, si hay razón para sospechar que su funcionamiento adrenal está alterado. La administración de corticosteroides tópicos a los niños deberá limitarse al periodo más corto y a la menor cantidad del producto compatible con un régimen terapéutico efectivo. Podrían ocurrir reacciones alérgicas cruzadas, las cuales ayudarían a prevenir el uso futuro de kanamicina, paromicina y estreptomicina. Esta preparación no es para uso oftálmico. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Ótica.Instilación de 3 ó 4 gotas en el oído, 2 a 4 veces al día. No existe evidencia de que excediendo la dosis máxima recomendada SYNALAR®-O sea más efectivo; de hecho, dosis mayores no deberán utilizarse. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: Véase Precauciones generales. PRESENTACIONES: Frasco gotero con 5 mL.Frasco gotero con 15 mL. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a no más de 30°C. Consérvese el frasco bien cerrado. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Su venta requiere receta médica. No se deje al alcance de los niños. Literatura exclusiva para médicos. No se administre durante el embarazo y lactancia. El uso durante este periodo queda bajo responsabilidad del médico tratante. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx o farmacovigilancia@chinoin.com Hecho en México por: PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, S.A. de C.V. Km 4.2 Carretera a Pabellón de Hidalgo C.P. 20420, Rincón de Romos, Aguascalientes, México. Reg. Núm. 65437 SSA IV Synalar ótico es un medicamento especializado y efectivo, ya que contiene cuatro sustancias activas con propiedades antiinflamatorias, antiprurítica (contrarresta la comezón), antialérgica, antibióticas y vasoconstrictora. Nombres Comerciales: Synalar-O Nombre Genérico: Acetónido de fluocinolona + Clorhidrato de Lidocaína + Sulfato de Neomicina + Polimixina B Presentaciones y Vía de Administración: Solución para administración ótica. Sus usos más frecuentes son para: Afecciones de oído. Synalar ótico es utilizado para tratar la siguiente enfermedad: Otitis externa: parte del oído (pabellón y conducto auditivo) que se encuentra inflamado debido a bacterias o a reacciones alérgicas, lo que provoca comezón y secreción amarillenta. Sus componentes se encargan de: Acetónido de fluocinolona: corticosteroide sintético que produce alivio contra la inflamación en diversas enfermedades de la piel. Clorhidrato de Lidocaína: anestésico local que bloquea la propagación del impulso impulso nervioso impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la capa de los nervios. Sulfato de Neomicina: antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de los aminoglucósidos, actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, como resultado se logra la muerte de las bacterias. Polimixina B: antibiótico que altera los polipéptidos(conjunto de proteínas), logrando así la muerte de las bacterias Es un fármaco altamente utilizado porque tiene diversas propiedades, y por lo cual, no se debe utilizar indiscriminadamente. Para encontrar el mejor precio de este medicamento compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Chedraui Farmacias del Ahorro Farmacias San Pablo Superama Gotas $150.00 $140.00 $150.00 $150.00 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Para adquirir la presentación en gotas por un precio mucho más económico, dirígete principalmente a Farmacias del Ahorro, pues, es dónde encontrarás el precio más barato. Por otro lado, el resto de las farmacias se ubican en un mismo precio, que se encuentra un 10% por encima del más accesible. Presentaciones y formas de Administración El laboratorio Chinoin comercializa Synalar-O en la siguiente presentación: Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Solución en gotas No 3-4 gotas 2-4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* No se deberán utilizar dosis mayores, al aumentar la dosis no se obtiene un mayor beneficio terapéutico. Si olvida colocar una dosis, use la dosis tan pronto se acuerde, excepto cuando este a menos de 3 horas de la siguiente dosis. No cubra áreas de la piel tratadas con ningún vendaje o algodón, al menos que su médico se lo indique, ya que al cubrirla se aumenta la cantidad de medicina que la piel del oído absorbe, lo que puede provocar efectos secundarios no deseados, así como la afectación de la capa protectora, logrando así que se provoque otra infección. Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo esté utilizando. Medicamento en niños: se recomienda su uso solamente por periodos cortos y previa valoración médica. Debido a que se puede ver retrasado su crecimiento si se absorben grandes cantidades a través de la piel. Generales: debe contraindicarse en pacientes con tuberculosis cutánea, herpes simple y varicela. Alergias: no debe recetarse ni consumirse si se es alérgico a Fluocinolona, Neomicina, Lidocaína y/o Polimixina B. Mezcla con Alcohol: el alcohol disminuye el efecto de todas las sustancias activas de Synalar ótico. Mezcla con otros medicamentos: hay resistencia con colistina. Compatibilidad de Synalar ótico en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Synalar-O tiene un riesgo medio durante el embarazo. Facmed de la UNAM no recomienda su uso durante el primer trimestre de embarazo, y durante los siguientes meses del embarazo deberán de valorarse los beneficios esperados en relación con los riesgos potenciales sobre el feto. Synalar-O tiene un riesgo bajo y puede utilizarse durante la lactancia materna. El portal especializado de e-lactancia.org menciona que es poco probable que las sustancias activas del fármaco pasen a través de la leche materna. Se debe tener precaución cuando se aplique, ya que podría ocasionar gastroenteritis en el bebé, ya que se altera la flora intestinal. Efectos Secundarios Oído: toxicidad. Sistema renal: toxicidad. Piel: ardor, comezón, irritación, resequedad, foliculosis, baja coloración de la piel, dermatitis alérgica, infección secundaria, atrofia, adelgazamiento. Aparato reproductor: alteración en la menstruación, impotencia, pérdida de interés en el sexo. Aparato respiratorio: dificultad para respirar. Síntomas de reacción alérgica: hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Trastornos del sueño: En combinación con la cafeína puede producir insomnio. Si presenta uno o más de los síntomas antes descritos deberá suspender el medicamento y consultar a un médico especialista, ya que Synalar-O puede provocar reacciones alérgicas que pueden agravar el estado de salud, así como daños irreversibles a los oídos y riñones. Fuentes Médicas Synalar ótico es un medicamento especializado y efectivo, ya que contiene cuatro sustancias activas con propiedades antiinflamatorias, antiprurítica (contrarresta la comezón), antialérgica, antibióticas y vasoconstrictora. Nombres Comerciales: Synalar-O Nombre Genérico: Acetónido de fluocinolona + Clorhidrato de Lidocaína + Sulfato de Neomicina + Polimixina B Presentaciones y Vía de Administración: Solución para administración ótica. Sus usos más frecuentes son para: Afecciones de oído. Synalar ótico es utilizado para tratar la siguiente enfermedad: Otitis externa: parte del oído (pabellón y conducto auditivo) que se encuentra inflamado debido a bacterias o a reacciones alérgicas, lo que provoca comezón y secreción amarillenta. Sus componentes se encargan de: Acetónido de fluocinolona: corticosteroide sintético que produce alivio contra la inflamación en diversas enfermedades de la piel. Clorhidrato de Lidocaína: anestésico local que bloquea la propagación del impulso impulso nervioso impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la capa de los nervios. Sulfato de Neomicina: antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de los aminoglucósidos, actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, como resultado se logra la muerte de las bacterias. Polimixina B: antibiótico que altera los polipéptidos(conjunto de proteínas), logrando así la muerte de las bacterias Es un fármaco altamente utilizado porque tiene diversas propiedades, y por lo cual, no se debe utilizar indiscriminadamente. Para encontrar el mejor precio de este medicamento compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Chedraui Farmacias del Ahorro Farmacias San Pablo Superama Gotas $150.00 $140.00 $150.00 $150.00 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Para adquirir la presentación en gotas por un precio mucho más económico, dirígete principalmente a Farmacias del Ahorro, pues, es dónde encontrarás el precio más barato. Por otro lado, el resto de las farmacias se ubican en un mismo precio, que se encuentra un 10% por encima del más accesible. Presentaciones y formas de Administración El laboratorio Chinoin comercializa Synalar-O en la siguiente presentación: Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Solución en gotas No 3-4 gotas 2-4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* No se deberán utilizar dosis mayores, al aumentar la dosis no se obtiene un mayor beneficio terapéutico. Si olvida colocar una dosis, use la dosis tan pronto se acuerde, excepto cuando este a menos de 3 horas de la siguiente dosis. No cubra áreas de la piel tratadas con ningún vendaje o algodón, al menos que su médico se lo indique, ya que al cubrirla se aumenta la cantidad de medicina que la piel del oído absorbe, lo que puede provocar efectos secundarios no deseados, así como la afectación de la capa protectora, logrando así que se provoque otra infección. Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo esté utilizando. Medicamento en niños: se recomienda su uso solamente por periodos cortos y previa valoración médica. Debido a que se puede ver retrasado su crecimiento si se absorben grandes cantidades a través de la piel. Generales: debe contraindicarse en pacientes con tuberculosis cutánea, herpes simple y varicela. Alergias: no debe recetarse ni consumirse si se es alérgico a Fluocinolona, Neomicina, Lidocaína y/o Polimixina B. Mezcla con Alcohol: el alcohol disminuye el efecto de todas las sustancias activas de Synalar ótico. Mezcla con otros medicamentos: hay resistencia con colistina. Compatibilidad de Synalar ótico en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Synalar-O tiene un riesgo medio durante el embarazo. Facmed de la UNAM no recomienda su uso durante el primer trimestre de embarazo, y durante los siguientes meses del embarazo deberán de valorarse los beneficios esperados en relación con los riesgos potenciales sobre el feto. Synalar-O tiene un riesgo bajo y puede utilizarse durante la lactancia materna. El portal especializado de e-lactancia.org menciona que es poco probable que las sustancias activas del fármaco pasen a través de la leche materna. Se debe tener precaución cuando se aplique, ya que podría ocasionar gastroenteritis en el bebé, ya que se altera la flora intestinal. Efectos Secundarios Oído: toxicidad. Sistema renal: toxicidad. Piel: ardor, comezón, irritación, resequedad, foliculosis, baja coloración de la piel, dermatitis alérgica, infección secundaria, atrofia, adelgazamiento. Aparato reproductor: alteración en la menstruación, impotencia, pérdida de interés en el sexo. Aparato respiratorio: dificultad para respirar. Síntomas de reacción alérgica: hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Trastornos del sueño: En combinación con la cafeína puede producir insomnio. Si presenta uno o más de los síntomas antes descritos deberá suspender el medicamento y consultar a un médico especialista, ya que Synalar-O puede provocar reacciones alérgicas que pueden agravar el estado de salud, así como daños irreversibles a los oídos y riñones. Fuentes Médicas Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. Adultos y niños a partir de 1 año: Puede aplicarse en cura abierta, como una capa fina en la zona afectada de la piel, de dos a tres veces al día frotando suavemente hasta su total absorción. Puede también aplicarse en cura oclusiva, como una capa fina en la zona afectada de la piel, una vez al día cubriendo ésta con un vendaje plástico no poroso. Su médico le indicará la duración de su tratamiento; normalmente una semana. Dependiendo de la gravedad de la afección, el tratamiento puede prolongarse de 1 a 4 semanas. Si en este periodo de tiempo no mejora, su médico debe reevaluar el tratamiento. El tratamiento no debe exceder de 2 meses. Uso en niños No se recomienda el uso en niños menores de 1 año. No se recomienda el uso de vendajes oclusivos (como en la zona del pañal). En niños, el tratamiento debe limitarse a períodos cortos de tiempo y se debe utilizar la mínima cantidad eficaz de medicamento. Si se utiliza en la cara, el tratamiento debe ser de hasta 5 días y en general una semana como máximo en otras zonas corporales. Si usa más Synalar del que debe El uso de cantidades excesivas de crema puede causar supresión adrenal (que origina una alteración de la producción normal de hormonas). En este caso, se debe interrumpir el tratamiento y el médico deberá controlarle la función del eje suprarrenal hormonal. Una ingestión accidental puede ocasionar cuadros de taquicardia (aceleración del ritmo del corazón) y elevaciones ocasionales de tensión arterial, que ceden sin necesidad de tratamiento médico. Si usted ha utilizado este medicamento más de lo que debe, consulte inmediatamente a su médico, farmacéutico o llame al Servicio de Información de Toxicología, teléfono 91-562 04 20 indicando el medicamento y la cantidad utilizada. Si olvidó usar Synalar No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si usted olvida aplicar la crema en el momento previsto, hágalo tan pronto como se acuerde y luego continúe como antes. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. Synalar ótico es un medicamento especializado y efectivo, ya que contiene cuatro sustancias activas con propiedades antiinflamatorias, antiprurítica (contrarresta la comezón), antialérgica, antibióticas y vasoconstrictora. Nombres Comerciales: Synalar-O Nombre Genérico: Acetónido de fluocinolona + Clorhidrato de Lidocaína + Sulfato de Neomicina + Polimixina B Presentaciones y Vía de Administración: Solución para administración ótica. Sus usos más frecuentes son para: Afecciones de oído. Synalar ótico es utilizado para tratar la siguiente enfermedad: Otitis externa: parte del oído (pabellón y conducto auditivo) que se encuentra inflamado debido a bacterias o a reacciones alérgicas, lo que provoca comezón y secreción amarillenta. Sus componentes se encargan de: Acetónido de fluocinolona: corticosteroide sintético que produce alivio contra la inflamación en diversas enfermedades de la piel. Clorhidrato de Lidocaína: anestésico local que bloquea la propagación del impulso impulso nervioso impidiendo la entrada de iones de sodio a través de la capa de los nervios. Sulfato de Neomicina: antibiótico de amplio espectro perteneciente al grupo de los aminoglucósidos, actúa inhibiendo la síntesis de proteínas, como resultado se logra la muerte de las bacterias. Polimixina B: antibiótico que altera los polipéptidos(conjunto de proteínas), logrando así la muerte de las bacterias Es un fármaco altamente utilizado porque tiene diversas propiedades, y por lo cual, no se debe utilizar indiscriminadamente. Para encontrar el mejor precio de este medicamento compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Chedraui Farmacias del Ahorro Farmacias San Pablo Superama Gotas $150.00 $140.00 $150.00 $150.00 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Febrero 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Para adquirir la presentación en gotas por un precio mucho más económico, dirígete principalmente a Farmacias del Ahorro, pues, es dónde encontrarás el precio más barato. Por otro lado, el resto de las farmacias se ubican en un mismo precio, que se encuentra un 10% por encima del más accesible. Presentaciones y formas de Administración El laboratorio Chinoin comercializa Synalar-O en la siguiente presentación: Dosis Recomendadas por Edad Presentación 0 a 12 años Adultos Veces al día Solución en gotas No 3-4 gotas 2-4 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* No se deberán utilizar dosis mayores, al aumentar la dosis no se obtiene un mayor beneficio terapéutico. Si olvida colocar una dosis, use la dosis tan pronto se acuerde, excepto cuando este a menos de 3 horas de la siguiente dosis. No cubra áreas de la piel tratadas con ningún vendaje o algodón, al menos que su médico se lo indique, ya que al cubrirla se aumenta la cantidad de medicina que la piel del oído absorbe, lo que puede provocar efectos secundarios no deseados, así como la afectación de la capa protectora, logrando así que se provoque otra infección. Mantenga el frasco bien cerrado cuando no lo esté utilizando. Medicamento en niños: se recomienda su uso solamente por periodos cortos y previa valoración médica. Debido a que se puede ver retrasado su crecimiento si se absorben grandes cantidades a través de la piel. Generales: debe contraindicarse en pacientes con tuberculosis cutánea, herpes simple y varicela. Alergias: no debe recetarse ni consumirse si se es alérgico a Fluocinolona, Neomicina, Lidocaína y/o Polimixina B. Mezcla con Alcohol: el alcohol disminuye el efecto de todas las sustancias activas de Synalar ótico. Mezcla con otros medicamentos: hay resistencia con colistina. Compatibilidad de Synalar ótico en Embarazo y Lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Synalar-O tiene un riesgo medio durante el embarazo. Facmed de la UNAM no recomienda su uso durante el primer trimestre de embarazo, y durante los siguientes meses del embarazo deberán de valorarse los beneficios esperados en relación con los riesgos potenciales sobre el feto. Synalar-O tiene un riesgo bajo y puede utilizarse durante la lactancia materna. El portal especializado de e-lactancia.org menciona que es poco probable que las sustancias activas del fármaco pasen a través de la leche materna. Se debe tener precaución cuando se aplique, ya que podría ocasionar gastroenteritis en el bebé, ya que se altera la flora intestinal. Efectos Secundarios Oído: toxicidad. Sistema renal: toxicidad. Piel: ardor, comezón, irritación, resequedad, foliculosis, baja coloración de la piel, dermatitis alérgica, infección secundaria, atrofia, adelgazamiento. Aparato reproductor: alteración en la menstruación, impotencia, pérdida de interés en el sexo. Aparato respiratorio: dificultad para respirar. Síntomas de reacción alérgica: hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. Trastornos del sueño: En combinación con la cafeína puede producir insomnio. Si presenta uno o más de los síntomas antes descritos deberá suspender el medicamento y consultar a un médico especialista, ya que Synalar-O puede provocar reacciones alérgicas que pueden agravar el estado de salud, así como daños irreversibles a los oídos y riñones. Fuentes Médicas