Continue

نقص حديد بالانجليزي

يعرف الحديد (بالانجليزية: Iron) بأنه أحد العناصر الفلزية الضرورية لجسم الإنسان، إذ يقوم بالعديد من الوظائف الحيوية، فهو جزء من خضاب الدم (الهيموجلوبين) الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يساعد الحديد عضلات الجسم في تخزين الأكسجين واستخدامه. وفي تكوين الإنزيمات والبروتينات في الجسم. يحتاج الجسم الحديد بكميات معينة حتى يستطيع أداء وظائفه الحيوية، ولكن نقص الحديد لسبب أو آخر يؤدي إلى الضعف، وفي حال تفاقم النقص يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد (بالانجليزية: Iron Deficiency). وفقر الدم الناتج عن نقص الحديد [illegible]

Moreover, it was found that more than 40 per cent of women in the reproductive age group were suffering from iron deficiency anaemia. UN 235 في المائة من النساء اللاتي بلغن سن الإنجاب يعانين من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. UN 235- وبما أن العديد من النساء من سوء التغذية، ولا سيما فقر الدم الناجم عن نقص الحديد suffer from malnutrition, in particular iron deficiency anaemia. UN 235- وبما أن العديد من النساء من سوء التغذية، ولا سيما فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. Since 2002, the sum reimbursed for medicines to treat iron deficiency anaemia has increased steadily, to 7.8 million soms in 2005. UN 2005 مليون سوم في عام 7.8 إلى عن نقص الحديد باطراد ليصل [illegible]

programmes. UN الحديد لدى النساء، والوفيات بسبب الحصبة، وحالات الإصابة بالحصبة، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة بسبب الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحاد. UN 235 وفي حين متزايد من البلدان، تعتبر الجهود المبذولة للحد من فقر الدم بسبب نقص الحديد جزءا من برامج التغذية الوطنية. The prevalence of iron deficiency anaemia among pregnant women was 52.6 per cent UN 235 [illegible] low-birth weight, iron deficiency anaemia in women, measles deaths, measles cases, deaths of children under five years of age caused by diarrhoea, and acute respiratory infections. UN

well as to assess the knowledge and attitudes of adolescents enrolled in UNRWA schools towards healthy lifestyles, including reproductive health practices. UN وأيضا قيد الإعداد دراسات لتقييم انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأطفال والنساء، وكذلك لتقييم معرفة الكبار المسجلين في مدارس الأونروا ومواقفهم من أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك ممارسات الصحة الإنجابية. In collaboration with several organizations, UNU is carrying out a 12-country field research study to test the effectiveness of weekly versus daily doses of iron supplements for the prevention of iron deficiency anaemia. UN

anaemia in Kazakstan and Uzbekistan; and a workshop on rapid assessment procedures (RAP) was held in Dakar, in September with support from UNICEF. UN 62 وقامت الجامعة بدعم من اليونيسيف بعقد حلقة عمل بشأن إجراءات التقييم السريع في داكار، في أيلول/سبتمبر. UNU is carrying out a 12-country field research study to test the effectiveness of weekly versus daily doses of iron supplements for the prevention of iron deficiency anaemia.

prevalence of iron deficiency anaemia among children aged 6 to 36 months, pregnant women, lactating mothers and schoolchildren. UN وفي [illegible] babies suffering from this condition. UN

(e) Take measures to educate the public on healthy eating habits, providing the necessary dietary supplements to reduce the incidence of iron deficiency anaemia among mothers and children; UN (ه) تدابير لتثقيف الجمهور بشأن العادات الغذائية الصحية، مع توفير المكملات الغذائية الضرورية للحد من انتشار فقر الدم بسبب نقص الحديد في صفوف الأمهات والأطفال؛ focus on the prevalence of iron deficiency anaemia among women and children, the knowledge and attitudes of adolescents enrolled in UNRWA schools and the current prescribing practices of antibacterial drugs. UN 1,000 [illegible] 93- [illegible] medical meeting of experts and field practitioners. UN

prevention and control of micronutrient deficiencies, such as iodine deficiency disorder; vitamin C deficiency; and iron deficiency anaemia. UN [illegible] which leads to cases of iron deficiency anaemia among children, who are also repeatedly afflicted with infectious diseases. UN - 10 [illegible]

40k. 50k. 60k. 70k. 80k. 90k. 100k. المزيد • Nutritional deficiencies and related conditions in pregnant women and young mothers, including iron deficiency anaemia. UN ● أوجه النقص التغذوي وما يرتبط بها من الأحوال الصحية لدى الحوامل وصغار الأمهات، بما في ذلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد The Committee is concerned about the high incidence of malnutrition, infant mortality, iron deficiency disorders and malaria, especially among refugees and internally displaced persons. UN

deficiency anaemia has increased steadily, to 7.8 million soms in 2005. UN 235 2005 مليون سوم في عام 7.8 إلى ليصل باطراد نقص الحديد تعالج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد 2002، زاد المبلغ الذي يرد لقاء ثمن الأدوية التي تعالج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد women suffer from malnutrition, in particular iron deficiency anaemia. UN 235- وبما أن العديد من النساء من سوء التغذية، ولا سيما فقر الدم الناجم عن نقص الحديد The lack of scientific consensus on technical and operational problems in the area of iron deficiency anaemia was overcome in 1998 at a technical meeting of experts and field practitioners. UN

deficiency anaemia in children and pregnant women in the coming years. UN والحد من الفقر المتفشي عن نقص الحديد لدى الأطفال والحوامل. The nutrition programme introduced in 1991 continues to focus on the prevention and control of micronutrient deficiencies, such as iodine deficiency disorder; vitamin C deficiency; and iron deficiency anaemia. UN

schools towards healthy lifestyles, including reproductive health practices. UN وتوجد أيضا قيد الإعداد دراسات لتقييم انتشار فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأطفال والنساء، وكذلك لتقييم معرفة الكبار المسجلين في مدارس الأونروا ومواقفهم من أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك ممارسات الصحة الإنجابية. Anaemia, due to iron deficiency, is also very common among women, especially during pregnancy, and is a major contributory factor to the high maternal morbidity and mortality rates. UN

UNU is carrying out a 12-country field research study to test the effectiveness of weekly versus daily doses of iron supplements for the prevention of iron deficiency anaemia. UN [illegible] قطرا لاختبار فعالية جرعات [illegible] the several micronutrients that are in short supp

general health, growth, behaviour and work performance. UN يمثل فقر الدم الناتج عن نقص الحديد مشكلة خطيرة لها أهميتها في التأثير على الصحة العامة وعلى النمو والسلوك وأداء الأعمال (iii) Reduction by a third of the 1990 levels of iron-deficiency anaemia among women; UN ' 10 [illegible] 3k. 20k. 30k. 40k. 50k. 60k. 70k. 80k. 90k. 100k. أكثرها أهمية. UN

the several micronutrients that are in short supply, iron deficiency is the most important. UN ● Nutritional deficiencies and related conditions in pregnant women and young mothers, including iron deficiency anaemia. UN ● أوجه النقص التغذوي وما يرتبط بها من الأحوال الصحية لدى الحوامل وصغار الأمهات، بما في ذلك فقر الدم الناجم عن نقص الحديد In fact, approximately two thirds of the children in Gaza now suffer from anaemia, that is, iron deficiency. UN

and internally displaced persons. UN والحد من الفقر المتفشي عن نقص الحديد لدى الأطفال والحوامل. UN وبحلول الآن، يعاني ثلثا تقريبا من الأطفال في غزة من فقر الدم، أي من نقص الحديد. UN ومن بين عدة مبادرات دقيقة لا تتوافر بشكل كاف، فإن نقص الحديد هو أكثرها أهمية. UN

was found that more than 40 per cent of women in the reproductive age group were suffering from iron deficiency anaemia. UN واللجنة قلقة بشأن كثرة حالات سوء التغذية ووفيات الأمهات والإصابات الناجمة عن نقص الحديد والملاريا، لا سيما في أوساط اللاجئين والمشردين داخليا. UN ويصاب عدد أكبر من الإناث عن الرجل بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد مع أقصى ارتفاع لدى الحوامل والمرضعات. The Committee is concerned about the high incidence of malnutrition, infant mortality, iron deficiency disorders and malaria, especially among refugees and internally displaced persons. UN وتمة حملة جارية للقضاء على حالات نقص الحديد في المناطق المنكوبة بالفقر. UN

vital substances. UN وهن هم أكبر منهم سنا أصحوا يطبقين في التعلم في المدارس بسبب نقص الحديد ومواد حيوية أخرى (iii) Reduction by a third of the 1990 levels of iron-deficiency anaemia among women; UN ' 10 [illegible] حضر مستويات فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بين النساء المسجلة في [illegible] 3 Most frequent words and phrases Arabic-English: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, more | English-Arabic: 10k, 20k, 30k, 40k, 50k, 60k, 70k, 80k, 90k, 100k, more

reduce iron deficiency anaemia among women aged 15-45 by one-third. UN :: [illegible] وعند الأطفال الإناث اللواتي يعانين من نقص الحديد أكبر من عدد الأطفال الذكور. UN iron deficiency reduction initiatives have not yet been as successful, hi

women. UN ومع ذلك فإن نقص الحديد ما زال منتشرا على نطاق واسع بين الحوامل. UN ويجري أيضا الاضطلاع بأعمال بغرض إنشاء مصرف بيانات شامل للأشخاص المعنيين بمشكلة نقص الحديد في كل بلد. In a growing number of countries, efforts to reduce iron deficiency anaemia are part of national nutrition progra

deficiency, all your results are positive. Open Subtitles حصلت الفحوصات الطبية الخاصة بك مرة أخرى، وجاءنا من نقص الحديد ملحوظ جدا، جميع نتائجك إيجابية Open Subtitles نسيت ما اسم تلك الجروح لكن سببه أنيميا نقص الحديد Targets have also been set for a reduction in low-birth weight, iron deficiency anaemia in women, measles deaths, measles cases, deaths of children under five years of age caused by diarrhoea, and acute respiratory infections. UN